

手首の骨折手術(経皮ピンニング)を受けられる

様

主治医() 看護師()

	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)
	～手術前日	手術当日	術後1日目	術後2日目	術後3～6日目	術後7日目	術後10日目	術後14日目	術後3週目以降
達成目標	手術に必要な検査が済んでいる。 手術の必要性が理解できている。	痛みのコントロールができています。					臥床や姿勢による皮膚・神経障害がない。創部の状態が良好。		
食事	()まで食事可 ()時まで飲水可	朝から食事は食べられません。 主治医の許可があるまで絶飲食となります。							
安静度	ギプス固定をします。	術後はベット上安静です。		歩行可能(初回は必ずスタッフが付き添います。)三角巾をします。			主治医確認後、三角巾がとれます。		
清潔	入浴又は体拭き、爪きりをします マニキュア、ベディキュアはしないで下さい。		体拭きのタオルをお持ちします。看護師がお手伝いします。			シャワー浴 傷保護して看護師が手伝います		抜糸翌日より介助浴。お一人で入浴可能か確認後一般浴可能となります。	
排泄	自由 手術前の浣腸はありません。	手術前までに排尿を済ませて下さい。		歩行が可能であれば、付き添いでトイレに行くことができます。					
処置	内服薬を持って来られた方はスタッフにお伝えください。 術後の装具の確認 身長と体重を測定します。		傷の消毒をします。			抜糸(7～10日目)			
内服・点滴	眠れないときは遠慮なくおっしゃってください。	7時～8時頃に点滴開始				飲み薬にかわります 			
検査	採血 レントゲン 術前に必要な検査 	手術後にレントゲンを撮ります。				レントゲン		レントゲン	
その他	・手術前後の必要物品をお確かめください。 ・手術までに麻酔医の術前訪問があります。手術・麻酔同意書のサインをお願いします。	アクセサリ類、化粧品は、しないで下さい。		手指の痺れがあった場合はすぐに看護師に伝えてください。				退院もしくは状態により療養病棟への移動を伺います。退院が近づいたら外出、外泊をして自信をつけましょう。	